

GENERE	NOME COMUNE	FAMIGLIA
ACER CAMPESTRE	ACERO CAMPESTRE	ACERACEAE



L' acero campestre ha fogliame deciduo, corteccia brunastra fessurata in placche e suberosa, foglie con 5 (3) lobi, la pagina superiore verde scuro e lucida, la pagina inferiore più chiara..



terriccio Terra 30%, pomice 35%, torba 25%, terriccio di foglie 10%.

Sopporta bene le **potatura** a fine inverno

potatura La **pinzatura** va effettuata Accorciando i nuovi germogli ad uno o due paia di foglie. Cimare i rametti con internodi lunghi. Sopporta bene la tecnica della defogliazione (se ben preparata) nella prima decade di Giugno

applicazione filo Il periodo migliore per l'applicazione dei fili coincide con la stagione vegetativa, si interviene con fili di alluminio rivestiti con una guaina di gomma morbida, per evitare di segnare la corteccia

fertilizzazione Ogni 15 giorni con formulati nutritivi da marzo a maggio. In estate più diluita del solito. In autunno ridurre l'azoto.

innaffiatura Di frequente nel periodo estivo. Non lasciare asciugare completamente il terriccio

ubicazione Evitare l'esposizione della pianta ai raggi diretti del sole.

rinvaso Dato il vigore della pianta si consiglia un rinvaso ogni anno. Rinvasarne quando le gemme iniziano a gonfiarsi.

stile

malattie Attenzione agli eccessi di umidità, provocano varie patologie fungine nonché marciume radicale