

GENERE	NOME COMUNE	FAMIGLIA
ACERO PALMATO	ACERO PALMATO GIAPPONESE	ACERACEAE



I rami sono sottili, le foglie opposte, palmato-lobate. Il frutto è una samara doppia costituita da due semi che si prolungano in ala membranosa. Le foglie di solito sono verdi, anche screziate o porpora in primavera. In autunno hanno le tonalità dell'arancione, giallo, rosso e bruno. In estate tende ad inverdire. Ama l'habitat montuoso, collinare e l'altipiano. È una pianta ornamentale di lunga tradizione.



terriccio Terra rossa 60% - pomice 20% - argilla 20%.

**potatura
pinzatura** Potatura alla 1^a e 2^a foglia. In estate potare a 2-3 nodi e tagliare le foglie. Sopporta bene la defogliazione nella prima decade di giugno. La **pinzatura** va effettuata in modo delicato nel periodo vegetativo e, quando le gemme raggiungono i 2,5 cm di lunghezza circa.

**applicazione
filo** Il periodo migliore per l'applicazione dei fili coincide con la stagione vegetativa, si interviene con fili di alluminio rivestiti con una guaina di gomma morbida, per evitare l'incisione della corteccia.

fertilizzazione Ogni 15 giorni con formulati nutritivi da marzo a maggio. In estate più diluita del solito. In autunno ridurre l'azoto.

innaffiatura Di frequente nel periodo estivo evitando di far asciugare molto il terriccio .

ubicazione Evitare l'esposizione della pianta ai raggi diretti del sole.

rinvaso Dato il vigore della pianta si consiglia un rinvaso ogni anno. Rinvasare quando le gemme iniziano a gonfiarsi.

stile

malattie Attenzione agli eccessi di umidità che provocano varie patologie fungine nonché la possibilità di marciume radicale