

GENERE	NOME COMUNE	FAMIGLIA
<b><i>ACERO TRIDENTE</i></b>	<b><i>ACERO BURGERIANUM</i></b>	<b><i>ACERACEAE</i></b>



Nell'acero tridente la corteccia è bruno chiaro a macchie, le foglie sono tridentate con tre lobi corti, sopporta i terreni poveri.

Luogo d'origine: Cina Orientale



**terriccio** 50 % sabbia grossolana - 20% torba per l'acidità - 30% argilla granulosa

**potatura  
pinzatura** Fine inverno. L'acero tridente reagisce male alle potature drastiche, capitozzatura o taglio di grossi rami, è probabile un ritiro di linfa.  
Accorciare i nuovi germogli ad uno o due paia di foglie, cimare i rametti con internodi lunghi.

**applicazione  
filo** Nell'applicazione del filo, usare filo di alluminio ricoperto da guaina plastificata morbida o avvolto con carta.

**fertilizzazione** Quando si aprono i germogli, per il primo mese ogni settimana, poi fino a settembre ogni due settimane, non concimare nei mesi più caldi di luglio e agosto.

**innaffiatura** Più frequente nel periodo vegetativo, non lasciando asciugare completamente il terreno, nella stagione invernale fare asciugare leggermente il substrato per evitare danni alle radici provocati dal gelo.

**ubicazione** All'esterno. Nei mesi più caldi posizionare a mezz'ombra, in inverno riparare dal gelo nelle regioni a clima rigido.

**rinvaso** In primavera prima dell'apertura delle gemme. Ogni due anni per le piante giovani, ogni tre o quattro per quelle vecchie

**stile**

**malattie** Attenzione agli eccessi di umidità che provocano varie patologie fungine e probabile marciume radicale