

GENERE	NOME COMUNE	FAMIGLIA
<i>CELTIS AUSTRALIS</i>	<i>BAGOLARO</i>	<i>ULMACEAE</i>



E' detto comunemente "Spaccasassi". Ne sono descritte almeno 70 specie. Ha foglie appuntite, a margine seghettato verdi-grigie inferiormente.

Luogo d'origine: Europa meridionale, Nord Africa e Asia Minore.



terriccio Terra 70%, pomice 30%

**potatura
pinzatura** Fine inverno si effettua la drastica potatura.
Pinzare quando i nuovi germogli si allungano troppo lasciando l'ultima foglia all' interno della silhouette, per gli esemplari giovani pinzare più aggressivamente i germogli forti.

**applicazione
filo**

fertilizzazione In primavera e autunno ogni 20 giorni. Una concimazione ben calibrata favorisce la lignificazione

innaffiatura Quotidiana in estate, non lasciare asciugare completamente il terriccio superficiale.

ubicazione In pieno sole tutto l'anno, in inverno, nelle zone a clima freddo del nord, proteggere i piccoli bonsai.

rinvaso primavera o autunno ogni 3 anni con taglio generoso delle radici.

stile

malattie Acari, scolitidi, bruchi e afidi verdi. Virus del mosaico e grafiosi.